

TERAPIA DESENSIBILIZZANTE PER ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO

Nei **tre giorni** antecedenti l'indagine il paziente dovrà assumere:

DELTACORTENE 5MG CPR	1 COMPRESSA	DOPO COLAZIONE
NEXIUM 40MG CPR	1 COMPRESSA	ORE 10:00
ZIRTEC 10MG CPR	1 COMPRESSA	PRIMA DI ANDARE A DORMIRE

L'interessato dovrà presentarsi all'ora concordata per l'indagine a digiuno da 5 ore e si raccomanda di **NON** sospendere eventuali terapie farmacologiche prescritte (anche nel giorno previsto per l'indagine), salvo differente indicazione fornita dalla segreteria del Centro.

Solo nel caso di TAC con mezzo di contrasto è necessario sospendere la terapia con METFORMINA, due giorni prima e due giorni dopo l'indagine.

È obbligatorio presentare ai medici afferenti all'ambulatorio diagnostico tutta la documentazione inerente al quadro clinico, nonché eventuali ulteriori documentazioni mediche già in possesso del paziente.

Il giorno dell'esame ricordarsi di portare:

- Documento di riconoscimento
- Tessera sanitaria
- Esami precedenti o cartella clinica

Se eseguito in convenzione

- Impegnativa