

CENTRO GINOLFI MONDRAGONE
MEDICINA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA

INFORMATIVA RISONANZA MAGNETICA

CHE COS'E' La Rm è una tecnica diagnostica effettuata senza l'impiego di raggi X. Vengono utilizzati soltanto un forte campo magnetico ed onde a radiofrequenza. L'esame non è doloroso né fastidioso. E' richiesto il migliore grado possibile di immobilità sul lettino. Durante l'esame sentirà un rumore ritmico, che è del tutto normale. La durata dell'esame che può variare secondo il tipo di indagine richiesta.

RISCHI E CONTROINDICAZIONI Tutti gli studi svolti finora indicano che l'esame RM non produce effetti nocivi sul corpo umano.

L'ESAME NON PUO' ESSERE ESEGUITO SE:

• Si è portatori di pace-maker cardiaco e/o altri elettro-stimolatori o congegni elettromagnetici;

L'ESAME POTREBBE COMPORTARE RISCHI E QUINDI AVVERTA IL MEDICO SE:

- E' in gravidanza nei primi 3 mesi di gestazione;
- E' affetto da claustrofobia, epilessia, anemia grave, malattia psichiatrica;
- Ha lavorato come tornitore, saldatore, carrozziere, addetto alla lavorazione di vernici metallizzate;
- Ha avuto incidenti di caccia o da esplosione;
- Ha subito interventi chirurgici alla testa, al cuore, ai grossi vasi o ortopedici con impianto di protesi metalliche, chiodi, viti, fili metallici;
- E' portatore di pompe di infusione per farmaci, protesi acustiche, protesi oculari, protesi dentarie mobili;
- E' portatrice di spirale o altro dispositivo intra-uterino.

EFFETTI COLLATERALI DELL'ESAME RM

L'esame non provoca dolore tuttavia si possono sperimentare i seguenti effetti:

- Moderato riscaldamento di alcune parti del corpo.
- Contrazione involontaria o sensazione di pulsazione in alcuni muscoli.

Si raccomanda al paziente di avvertire l'operatore in caso di eccessivi disagi.

PER EFFETTUARE L'ESAME OCCORRE TOGLIERE: eventuali lenti a contatto, apparecchi per l'udito, piercing, protesi dentarie mobili e tutti gli oggetti metallici rimovibili indossati.

Prima di sottoporsi all'esame RM, in particolare per il distretto testa-collo, si prega di non utilizzare cosmetici al volto e/o lacca per capelli.

MEZZO DI CONTRASTO SE RICHIESTO

Nella maggior parte dei casi gli esami RM con mezzo di contrasto vengono richiesti da Medici di Base e/o Medici Specialisti nelle varie branche Cliniche o Chirurgiche.

Si specifica che la somministrazione del mezzo di contrasto al paziente è prerogativa del Medico-Radiologo il quale potrà decidere di NON eseguire l'esame indicato dai colleghi sopraccitati qualora non dovesse sussistere una specifica indicazione all'utilizzo dello stesso.

Pertanto si raccomanda:

- ***Ai Medici prescrittori/specialisti di essere possibilmente quanto più specifici nel descrivere il quesito diagnostico per l'esame richiesto***
- ***Al paziente di portare in visione, il giorno dell'esame, tutto ciò che è inerente all'esame richiesto (esami precedenti, prescrizione del Medico di Base, prescrizione specialistica ed esami preliminari da noi richiesti).***

Controindicazioni e precauzioni d'uso (situazioni nelle quali il MdC non deve essere somministrato o somministrato con particolare cautela)

- una funzionalità renale compromessa ed una accertata allergia al mezzo di contrasto sono le principali controindicazioni alla sua somministrazione.
- Donne in gravidanza o allattamento (valutazione del rapporto rischio/ beneficio).
- Altre allergie (deve essere effettuata apposita profilassi anti-allergica suggerita prima dell'esame).

Si raccomanda vivamente di informare il personale se ci si trova in una delle situazioni sopraelencate.

Effetti collaterali e reazioni avverse

Il mezzo di contrasto può raramente provocare alcune reazioni avverse che vengono classificate come lievi (nausea, vomito, prurito) moderate (vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo) e sono in genere risolte con semplici provvedimenti terapeutici. Rarissimamente, si possono verificare reazioni severe (shock ipotensivo, edema polmonare, shock anafilattico ed arresto cardio-respiratorio) che in casi eccezionali possono provocare reazioni letali.

La presenza oltre al Medico-Radiologo anche di un Anestesista e di tutti i presidi necessari garantiscono un intervento pronto ed efficace in caso di una reazione avversa al mezzo di contrasto.

In caso di allergie è necessario eseguire terapia desensibilizzante come da schema allegato.

Per le Risonanze Magnetiche con Mezzo di Contrasto, il giorno dell'esame, è necessario:

-Essere a digiuno da almeno 6 ore

-Far prendere visione, al Medico-Radiologo responsabile della diagnostica, ***gli esami preliminari richiesti come da allegato ed eseguiti entro e non oltre i 30 giorni precedenti.***

Si raccomanda di portare in visione eventuali accertamenti diagnostici precedentemente eseguiti

Preso atto delle informazioni fornite nel modulo, il paziente potrà richiedere ulteriori spiegazioni al medico radiologo.

Nome, Cognome e Firma del paziente per presa visione _____